

## 全国 2011 年 4 月自学考试学前卫生学试卷

### 课程代码:00385

一、单项选择题(本大题共 16 小题, 每小题 1 分, 共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. “低体重儿”是指新生儿出生时体重( B )1-2  
A. 等于或大于 2500 克 B. 小于 2500 克  
C. 大于 4000 克 D. 大于 6000 克
2. 正常新生儿每分钟呼吸约为( C )1-4  
A. 20 次左右 B. 30 次左右  
C. 40 次左右 D. 50 次左右
3. 用腋下表给婴幼儿测体温, 表示高烧的度数是( D )1-16  
A. 36.5℃ B. 37.1℃  
C. 37.8℃ D. 39.2℃
4. 婴幼儿眼球的前后距离短, 物体成像于视网膜后面, 这种现象是( D )2-39  
A. 习惯性近视 B. 生理性近视  
C. 习惯性远视 D. 生理性远视
5. 考察心血管系统发育状况的基本生理功能指标是( C )2-59  
A. 握力和背肌力 B. 肺活量  
C. 脉搏和血压 D. 身高和体重
6. 具有抗生酮作用的营养素是( C )3-84  
A. 脂类 B. 蛋白质  
C. 碳水化合物 D. 微量元素
7. 具有促进铁吸收功能的是( C )3-106  
A. 维生素 A B. 维生素 B<sub>1</sub>  
C. 维生素 C D. 维生素 D
8. 患有“坏血病”的人可能是体内缺乏维生素( C )3-100  
A. A B. B<sub>1</sub>  
C. C D. D
9. 中枢神经系统的毛细血管能限制血液中某些物质进入脑内, 称为( D )5-157  
A. 自然自动免疫 B. 人工自动免疫

自考备考三件宝: 自考笔记、真题及答案、录音课件!

C. 粘膜屏障作用 D. 血脑屏障作用

10. 百白破三联制剂的接种对象是年龄多大的正常小儿? ( A ) 5-160

A. 3 个月以上 B. 半岁以上

C. 9 个月以上 D. 1 周岁以上

11. 一般情况下, 病儿的体温在多少度以上, 就应及时采取降温措施? ( A ) 6-190

A. 39°C B. 38.5°C

C. 38°C D. 37°C

12. 对 3 岁以下小儿使用胸外心脏挤压法急救时, 左手托其背, 右手用手掌根部按压胸骨偏下方, 使胸骨下陷约 2 厘米左右, 然后放松, 每分钟按压 ( C ) 6-195

A. 120 次左右 B. 100 次左右

C. 80 次左右 D. 60 次左右

13. 夜惊是睡眠障碍的一种表现, 其产生的原因主要是 ( D ) 7-236

A. 生理因素 B. 神经因素

C. 社会因素 D. 心理因素

14. 婴儿孤独症早期生活环境的影响不容忽视, 其致病的因素主要是 ( A ) 7-254

A. 生物学因素 B. 神经性因素

C. 社会因素 D. 心理因素

15. 3~6 岁儿童定期体格检查一般隔多长时间检查一次? ( C ) 8-268

A. 6 个月 B. 9 个月

C. 12 个月 D. 15 个月

16. 病毒性乙型肝炎的潜伏期一般为 ( C ) 8-303

A. 15~30 日 B. 30~60 日

C. 60~90 日 D. 90~120 日

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17. 皮肤和粘膜是人体的第一道防线, 起着阻挡\_\_病原微生物\_\_\_\_入侵的作用。 5-157

18. 钩虫病患儿常有面色苍黄、皮肤干粗、毛发稀疏、乏力、眩晕等症状。某些患儿有“\_\_异嗜癖\_\_\_\_” 5-184

19. 6 个月以下乳儿应多采用\_\_物理\_\_\_\_法降温, 因为这种降温方法更为安全。 6-190

20. 心理健康教育的目标是: 培养学前儿童养成有益于心理健康的\_\_行为和习惯\_\_\_\_, 自觉抵制各种不健康行为, 增强自我心理保健的意识和能力, 健康成长。 7-216

21. 引起哮喘的病因主要有三方面: 过敏体质、致敏源和\_\_心理因素\_\_\_\_。 7-257

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

22. 新生儿呼吸时, 腹部可见明显起伏, 称为\_\_腹式\_\_\_\_呼吸。1-4
23. 新生儿发烧的常见原因有保暖过度、接种疫苗和\_\_感染\_\_\_\_。1-16
24. 听觉器官——耳可分为外耳、\_\_中耳\_\_\_\_和内耳三部分。2-41
25. 人的中枢神经系统只能利用体内\_\_葡萄糖\_\_\_\_氧化产生的能量, 所以对血糖含量十分敏感。2-51
26. 当儿童两眼向前平视时, 两眼的黑眼珠位置不匀称, 即称为\_\_斜视\_\_\_\_。4-146

### 三、判断改错题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

在题后的括号内, 正确的打“√”, 错误的打“×”并在题下空处进行改正。

27. 有惊厥史、脑损伤史者禁用百白破三联制剂。( √ )5-160
28. 流行性乙型脑炎起病急, 伴有发热、头痛、喷射性呕吐、嗜睡等症状, 不会留下后遗症。( × )5-173  
答: 流行性乙型脑炎起病急; 发热、头痛、喷射性呕吐、嗜睡。但少数病人仍可留下后遗症, 如不能说话、肢体瘫痪、智力减退等。
29. 小儿时期以原发性肺结核最常见, 即结核菌初次侵入肺部引起的原发感染。( √ )5-180
30. 哮喘是由多种刺激因素引起的呼吸道疾病。( × )7-257  
答: 哮喘是支气管哮喘的简称。该病是由多种刺激因素引起的呼吸道变态反应性疾病。变态反应又称过敏反应。荨麻疹、哮喘、过敏性鼻炎等均属于变态反应性疾病。
31. 幼儿膳食计划中, 每餐热量分配, 早餐占 25%, 午餐占 35%, 午点占 15%, 晚餐占 25%。( × )8-281  
答: 每餐热量分配, 早餐占 25%, 午餐占 35%, 午点占 10%, 晚餐占 30%。
32. 新生儿的体型特点是头大、四肢长。( √ )1-3
33. 骨与骨之间可以活动的连结叫骨连结。( × )2-26  
答: 骨连结是骨与骨之间的连结, 可以活动的骨连结叫关节。
34. 婴幼儿眼睛调节范围窄, 距离近的物体不易看清。( × )2-39  
答: 婴幼儿晶状体的弹性好, 调节范围广, 使近在眼前的物体, 也能因晶状体的凸度加大, 成像在视网膜上。
35. 脂溶性维生素在人体内不能储存, 所以几乎没有毒性。( × )3-94  
答: 吸收后的脂溶性维生素在肝脏内储存, 如果过量摄入, 在体内大量蓄积, 会引起中毒。
36. 喷射性呕吐往往是由胃肠炎等疾病引起的。( × )4-129  
答: 喷射性呕吐: 不同于胃肠炎等疾病引起的呕吐。喷射性呕吐是由于颅内压力增高引起的, 没有感到恶心即喷吐出来。胃肠道疾病等引起的呕吐, 一般先有恶心, 然后吐出。

### 四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

37. 简述加强免疫的概念。5-161

答：进行基础免疫后，机体获得相当强的免疫力；经过一定时间，免疫力逐渐下降；当下降到一定程度时，重复接种一次，就很容易使免疫力再度提高，以巩固免疫效果：这种复种叫加强免疫。

38. 简述婴幼儿心理健康的标志。7-207

答：儿童的身心正处于迅速发展的阶段，他们心理健康的特征是与他们的身心发展紧密联系在一起。

下面谈到的儿童心理健康的标志，是“理想”的标志。每个儿童都可能在这方面或那方面的不足，之所以提出心理健康的标志，可以把它看成是培养儿童应努力达到的目标。

- (1) 智力发展正常。
- (2) 情绪稳定，情绪反应适度。
- (3) 乐于与人交往，人际关系融洽。
- (4) 行为统一和协调。
- (5) 性格特征良好。

39. 简述婴幼儿乳牙的生理功能。2-33

答：

- (1) 咀嚼食物，帮助消化
- (2) 促进颌骨的发育
- (3) 有助于口齿伶俐
- (4) 有利于恒牙的健康

40. 简述维生素 A 的生理功能。3-95

答：(1) 维生素 A 与正常视觉有密切关系：在人的视网膜上有两种视觉细胞，一种叫视锥细胞，另一种叫视杆细胞。前者接受强光刺激，并能辨别颜色；后者接受弱光刺激，其中的感光物质叫“视紫红质”，维生素 A 是视紫红质的重要组成成分。

(2) 维生素 A 与上皮细胞的正常形成有关：维生素 A 是上皮细胞生长、结构完整所必需的营养素。呼吸道、消化道、泌尿道以及皮肤的健康均与维生素 A 有关。泪腺上皮细胞的健全也不可缺少维生素 A。

(3) 维生素 A 能促进正常的生长发育，提高机体免疫力。

41. 引发错颌的原因有哪些？4-145

答：一、先天因素

双亲的错颌畸形可遗传给子女。

二、后天因素

- 1、疾病
- 2、营养与饮食习惯
- 3、不良习惯

五、简答题(本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分)

42. 麻疹、风疹、幼儿急疹三种急性出疹性疾病的症状有何不同？5-168

答：一、麻疹：

- 1、病初的症状和患感冒差不多，有发烧、咳嗽、流鼻涕、眼怕光流泪等现象。
- 2、发烧后 2-3 天，口腔粘膜会有改变。从两侧白齿旁的颊粘膜上，可以看到周围有红晕、中心发白的小斑点，叫费一科氏斑，下唇也可以有相似的斑点，这是麻疹所特有的症状。
- 3、发烧后 3~4 天，开始出皮疹。皮疹先由耳后出现，渐至颈部、面部、躯干、四肢，最后手心、脚心出疹，皮疹颜色鲜红，略高出皮肤，皮疹之间可见到正常的皮肤颜色。
- 4、出疹一般持续 3-4 天，疹子出齐后开始消退，体温渐恢复正常。皮疹消退后皮肤上留有褐色的斑点，经 2-3 周斑点消失。

## 二、风疹

- 1、病初可有发烧、咳嗽、流鼻涕等症状。多为低烧。
- 2、发烧当日或次日出现皮疹。皮疹很快布满全身，但手心、脚心一般无皮疹。
- 3、耳后及枕部淋巴结肿大。

## 三、幼儿急疹

- 1、起病突然，高烧可达 40℃，食欲差，但小儿精神还好。
- 2、高烧 3-4 天后，体温骤然下降，同时面部及身上出现红色疹子，经 1-2 日皮疹全部退尽。

### 43. 制订食谱的原则是什么? 8-281

- 答：(1) 执行膳食计划所拟定的食品种类和数量。  
(2) 注意季节变化，冬季多用高热量食物，夏季可多用清淡凉爽的食物。  
(3) 食谱所列的烹调法和食物应适合儿童的消化能力。  
(4) 品种多样化，并能促进食欲。  
(5) 注意观察儿童接受食物的情况，必要时作调整。  
(6) 每周更换食谱。

### 44. 婴幼儿骨骼发育有哪些特点? 2-26

- 答：(1) 骨骼在生长  
(2) 腕骨没钙化好  
(3) 骨盆还没长结实  
(4) 骨头好比鲜嫩的柳枝  
(5) 不良姿势易致脊柱变形

## 六、论述题(本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分)

### 45. 试述灾后防疫的重要性。5-186

- 答：(1) 洪涝灾害，造成人、畜等粪便污染水源，可以导致急性肠道传染病的暴发流行，比如甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、伤寒等疾病。  
(2) 受灾后，居住条件简陋，居住拥挤，冬春季易造成流行性脑脊髓膜炎的流行。  
(3) 洪涝灾害可使血吸虫病疫区扩大，粪便直接污染水源的机会增加，为血吸虫病的流行提供了条件。  
(4) 受灾后，人们常居住在野外，使人畜共患性疾病增加。比如流行性出血热、钩端螺旋体病等等。

### 46. 试述提高食物中蛋白质营养价值的措施。3-78

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

答: (1)蛋白质的互补作用

将谷类与豆类或其他食物混食后,使必需氨基酸得以互相补充,从而提高食物蛋白质的营养价值,称为蛋白质的互补作用。

(2)提高豆类的消化率

将豆类适当地加工、烹调,可以提高其消化利用率。

(3)氨基酸强化食品

食品中补充某些缺乏或特别需要的营养素,称为强化食品。谷类为主食,但因其所含必需氨基酸的比例不够理想,缺乏赖氨酸,使其蛋白质的营养价值不高。但是,赖氨酸并非万能的滋补品,不随意加在任何食品中。如蛋类和乳类所含必需氨基酸比例已较合理,如再添加赖氨酸反而破坏了其合理的比例,影响了吸收利用。

## 七、案例分析题(本大题 10 分)4-138

47. 某对体重正常的父母生有一子, 现年 6 岁, 体重 30 公斤 (6 岁儿童的标准体重是 21 公斤)。

请问: (1) 该男童属于什么程度的肥胖症? 为什么?

(2) 该男童体重肥胖的可能原因有哪些?

(3) 父母可采取哪些干预措施?

(1) 答: 因过量的脂肪储存使体重超过正常 20% 以上的营养过剩性疾病称为肥胖症。超过标准体重 20% - 30% 者为轻度肥胖症; 超过 30% - 50% 者为中度肥胖症; 超过 50% 以上者为高度肥胖症。

该男童的体重超过标准体重的 42%, 所以为中度肥胖症。

(2) 答: 该男童体重肥胖的可能原因有:

- (1) 多食
- (2) 少动
- (3) 心理因素
- (4) 内分泌疾病

(3) 答: 父母可采取以下干预措施:

(1) 饮食管理

调节饮食的原则如下:

- ① 必须满足小儿的基本营养需要, 以保证生长发育。
- ② 不宜使体重骤然减轻。最初, 只要求制止体重速增, 以后可使其逐渐下降, 至超过该年龄正常体重 10% 左右时, 即不需严格限制食物。
- ③ 仍须设法满足小儿食欲, 不致因饥饿而痛苦。故应多选热量少而体积大的食物, 如芹菜、笋、萝卜等。必要时可在两餐之间供给热量较低的点心。
- ④ 蛋白质的供应量不宜少于 1-2 克/公斤/日。碳水化合物为供给热量的主要食品。限制脂肪。总热量视每个病儿的实际情况而定, 每日供热量应比正常供热量少。维生素和矿物质的供应要充足。
- ⑤ 根据以上原则, 食品应以蔬菜、水果、米饭、面食为主, 外加适量的蛋白质包括瘦肉、鱼、鸡蛋、豆类、豆制品等。饮食调理须长期坚持, 才能获得满意的结果。

(2) 解除精神负担：不必到处求医，使小儿感到紧张不安。改变以往的饮食习惯也不能操之过急。若过多地干预，可能使小儿产生对抗心理。

(3) 增加运动量：应提高病儿对各种体育活动的兴趣。活动时间逐渐增加。应避免剧烈运动，以免使食欲激增。

(4) 不可服减肥药。

(5) 因内分泌疾病等所致的肥胖症，针对病因进行治疗。

**考试课件网：** <http://www.examebook.cn/>

——我们专业提供自考易考题库课件集、自考免费电子书、自考历年真题及标准答案！

**考试真题软件网：** <http://down.examebook.com/>

——我们专业提供自考历年真题及答案整理版、自考考前模拟试题！

**考试学习软件商城：** <http://www.examebook.com/>

——为您提供各种考试学习软件课件更为便利的购买通道！

自考备考三件宝：  
自考笔记、  
真题及答案、  
录音课件！