

## 全国 2009 年 7 月自学考试学前卫生学试题

课程代码: 00385

### 一、单项选择题(本大题共 16 小题, 每小题 1 分, 共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 新生儿出现水肿现象往往发生在出生后( B )1-4  
A. 1 天 B. 3~5 天  
C. 10 天 D. 30 天
2. 婴幼儿呼吸方式的特点是( B ) 1-4  
A. 以胸式呼吸为主 B. 以腹式呼吸为主  
C. 胸式呼吸和腹式呼吸两种方式并重 D. 既不属于胸式呼吸也不属于腹式呼吸
3. 儿童在出生后某一时期胸围会赶上头围, 该现象发生的时间段是( B )2-59  
A. 6 个月左右 B. 1 岁左右  
C. 1 岁半左右 D. 2 岁左右
4. 儿童体格发育最重要及最常用的形态指标是( C )2-58  
A. 手长、足长 B. 上下肢长度  
C. 身高和体重 D. 头围和胸围
5. 具有抗生酮作用的营养素是( C )3-84  
A. 蛋白质 B. 脂类  
C. 碳水化合物 D. 水
6. 不属于引起食物中毒原因的是( D )3-116  
A. 食品被污染 B. 动植物组织本身含有有毒物质  
C. 有毒化学物质被加入食品之中 D. 食用致敏食物
7. 不属于营养性巨幼细胞性贫血症状表现的是( D )4-143  
A. 面色苍黄 B. 肝、脾、淋巴结肿大  
C. 表情呆滞、嗜睡 D. 恶心
8. “常规遮盖法”被公认为是一种简便易行的有效方法, 主要用来治疗( C )4-147  
A. 远视 B. 近视  
C. 弱视 D. 散光
9. 丙种球蛋白是( B )5-158

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

- A. 自动免疫制剂 B. 被动免疫制剂  
C. 非特异性免疫制剂 D. 自然自动免疫制剂
10. 具有低烧、多汗、夜惊、磨牙症状表现的儿童可能患了( A )5-182  
A. 蛔虫病 B. 蛲虫病  
C. 钩虫病 D. 鞭虫病
11. 给儿童测体温前要让体温计的水银线处于( C )6-189  
A. 37℃以下 B. 36℃以下  
C. 35℃以下 D. 34℃以下
12. 儿童梦魇现象属于( A )7-236  
A. 睡眠障碍 B. 情绪障碍  
C. 品行障碍 D. 心理机能发育迟缓
13. 家长或教师矫治儿童焦虑症、恐怖症时可采用的方法是( A )7-261  
A. 系统脱敏法 B. 阳性强化法  
C. 负强化法 D. 消退法
14. 儿童膳食中所供热能占总热量 25%的餐点是( A )8-281  
A. 早餐 B. 午餐  
C. 午点 D. 晚餐
15. 一般情况下, 骨折现场急救处理的第一步是( A )6-196  
A. 固定 B. 冷敷  
C. 止血 D. 把伤者移到担架上
16. 给婴幼儿测量体温的合适情境是( B )6-190  
A. 哭闹 B. 饭后  
C. 运动后 D. 安静后

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17. 母乳中含有丰富的\_\_牛磺酸\_\_\_\_\_, 是促使新生儿脑细胞发育的重要物质。1-20
18. 幼儿的\_\_音域\_\_\_\_\_窄, 不宜唱大人的歌曲。2-30
19. 儿童脑细胞的耗氧量约占全身耗氧量的\_\_50\_\_\_%。2-51
20. 营养学中常用的热能单位千卡与千焦耳的换算公式是: 1 千卡=\_\_4. 184\_\_\_\_\_千焦耳。3-75
21. 婴幼儿食欲不振的常见原因包括\_\_精神因素\_\_\_\_\_, 饮食习惯不良、疾病所致三个方面。4-131

22. 世界卫生组织 (WHO) 要求在全球消灭的第一种传染病是\_\_天花\_\_\_\_。5-163
23. 婴幼儿心理评估的方法包括自由交谈、\_问卷\_\_\_\_、观察、筛选检查、诊断测验。  
7-226
24. 引发儿童哮喘的原因主要有过敏体质、致敏源和\_\_心理因素\_\_\_\_三个因素。7-257
25. 儿童不正常行为的表现类型包括行为不足、\_行为过度\_\_\_\_和不当行为。7-260
26. 1~3 岁的儿童每\_\_6\_\_\_\_个月定期体格检查一次。8-267

### 三、判断改错题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

在题后的括号内, 正确的打“√”, 错误的打“×”并在题下空处改正。

27. 新生儿出生时头发的粗细、稀密、长短程度反映了新生儿体质的强弱。(× ) 1-4  
答: 出生时头发稀少并不预示着以后头发就少, 也不反映体质的强弱。
28. 婴幼儿的皮肤保护功能和调节体温的功能差, 但渗透作用强。( √ )2-37
29. 儿童骨骼系统发育受遗传因素影响较大, 体重却易受环境因素的影响。( √ )2-56
30. 预防动脉硬化要从青年时期开始。( × )3-82  
答: 预防动脉硬化要从儿童时期开始。
31. 化脓性中耳炎会发生传音性耳聋。( × )4-148  
答: 非化脓性中耳炎日久, 积液中的矿物质沉积下来, 使听小骨发生粘连, 听骨链的作用被破坏, 声音传导发生障碍, 发生传音性耳聋。
32. 婴幼儿若患钩虫病, 或缺锌、缺铁可致异嗜癖。(√ )4-126
33. 人体感染流行性感冒后所获免疫力相当持久。(× )5-172  
答: 流行性感冒病后免疫力不持久。
34. 使用胸外心脏挤压法救助婴幼儿时, 要垂直向下用力。( √ )6-195
35. 攻击性行为、说谎、拒绝上幼儿园都是儿童品行障碍的表现。( √ )7-237
36. 给儿童制定食谱时要注意季节变化, 冬季多用高热量食物。( √ )8-281

### 四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

37. 简述婴儿乳牙的生理功能。2-33

答: (1) 咀嚼食物, 帮助消化

- (2) 促进颌骨的发育
- (3) 有助于口齿伶俐
- (4) 有利于恒牙的健康

38. 简述婴幼儿骨骼发育的特点。2-26

答: (1) 骨骼在生长

- (2) 腕骨没钙化好
- (3) 骨盆还没长结实

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

- (4) 骨头好比鲜嫩的柳枝
- (5) 不良姿势易致脊柱变形

39. 简述婴幼儿体内缺铁的原因。4-141

- 答：(1) 先天储铁不足。  
(2) 饮食中铁的摄入量不足。  
(3) 生长发育过快。  
(4) 疾病的影响。

40. 简述小儿结核病的症状。5-180

- 答：(1) 病初可有低烧、轻咳、食欲减退。  
(2) 病情发展则有长期不规则低烧、盗汗、乏力、消瘦等症状。  
(3) 若给予合理、及时的治疗，预后良好，原发病灶钙化。  
(4) 未经合理治疗，病灶长期残留，有可能发展成继发性肺结核。

41. 简述儿童期多动综合症的矫治措施。7-243

- 答：(1) 对于学前儿童，治疗多动症一般不宜使用药物。  
(2) 心理治疗：调整家庭环境，父母要改变管束过严、动辄打骂和溺爱放任两种不正确的教育方法，以消除各种紧张刺激。严格作息制度，增加文体活动，对治疗也有积极作用。  
(3) “视、听、动”能力训练：多动儿常在绘画、语言、动作技  
(4) 注意力训练  
①视觉注意力训练：主要是通过让儿童凭借视觉来感知信息以达到训练注意力的目的。  
②听觉注意力训练：主要是指通过让幼儿用听觉感知信息，从而达到训练注意力的目的。  
③动作注意力训练：主要是指通过让幼儿来完成特定的动作，达到训练注意力的目的。  
④混合注意力训练：主要是指通过让幼儿的几种感知器官同时参与活动，从而达到训练注意力的目的。

五、问答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

42. 婴幼儿神经系统的特点是什么？2-49

- 答：(1) 神经系统发育迅速。  
(2) 容易兴奋、容易疲劳。  
(3) 需要较长的睡眠时间。  
(4) 脑细胞的耗氧量大。  
(5) 脑细胞能利用的能量来源单一。

43. 儿童发生龋齿的原因有哪些？4-143

- 答：(1) 口腔中细菌的破坏作用  
变形链球菌和乳酸杆菌在口腔的残留食物上繁殖产酸，酸使牙釉质脱钙，形成龋洞。  
(2) 牙面、牙缝中的食物残渣  
小儿临睡前吃东西，或口含食物睡觉，滞留在牙面牙缝的食物残渣，尤其是糖果、糕点等甜食残渣，是造成龋齿的重要因素之一。  
(3) 牙齿结构上的缺陷

①牙釉质发育不良。②牙齿排列不齐。

44. 儿童集体膳食的卫生要求有哪些? 8-279

答: (1) 符合儿童的营养需要。膳食中各种营养素种类齐全, 供应量适宜, 可满足儿童的营养需要。

(2) 适合儿童的消化能力。食物的品种、数量和烹调方法, 应适合儿童胃肠道的消化吸收功能。

(3) 促进食欲。尽量使食物的外形美, 色诱人, 味可口, 香气浓, 花样多, 以促进食欲。

(4) 清洁卫生。绝对保证饮食卫生, 严防食物中毒。

六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

45. 试述“动力定型”在幼儿一日生活中的应用, 并举例说明。8-275

答: (1) 将婴幼儿一日生活中的主要环节, 如起床、早操、盥洗、进餐、游戏、户外活动、睡眠、作业等加以合理安排, 使儿童养成习惯, 到什么时候就知道干什么, 干时轻松、愉快, 形成动力定型。

(2) 建立动力定型后, 各种生理活动更有规律, 吃饭时食欲好, 就寝时入睡快, 游戏时精力充沛, 作业时精集中, 从而节省了神经细胞的功能消耗, 起到“事半功倍”的效果。

46. 结合实践试述开展儿童心理健康教育的主要内容。7-216

答: 对幼儿进行心理健康教育, 要让他们学会调整自己的情绪, 学习社会交往的技能, 要培养幼儿有良好的生活习惯, 还要对幼儿进行健康的性教育。

一、学会调整自己的情绪

1、懂得哪些要求合理, 哪些要求不合理

2、学会合理发泄不良情绪

二、学习社会交往技能

1、移情教育

2、分享与合作

3、恰当的自我评价

三、培养幼儿良好的生活习惯

良好的生活习惯, 有益于幼儿情绪饱满、情绪稳定,

1、有规律的生活

2、良好的卫生习惯

四、性教育

健康的性教育, 大致体现在以下几个方面。

1、没有性歧视

2、没有性压抑

3、自然地回答性问题

4、两性别优势互补教育

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

自考备考三件宝: 自考笔记、真题及答案、录音课件!

七、案例分析题(本大题 10 分)2-70

47. 案例：某女童，3 岁，身高 90 厘米，体重 11 公斤。其相关数据列题 47 表如下：

题 47 表 1: 3 岁男童女童年龄别体重、身高（高）参考值

年龄(岁)	性别	体重(公斤)			身高(厘米)		
		-2SD	中位数	+2SD	-2SD	中位数	+2SD
3	男	11.4	14.6	18.3	87.3	94.9	102.5
	女	11.2	14.1	17.9	86.5	93.9	101.4

题 47 表 2: 男、女童身高 90~91 厘米体重参考值（公斤）

身高(厘米)	性别	-2SD 中位数 +2SD			身高(厘米)	性别	-2SD 中位数 +2SD		
		90	男	11.0			13.0	15.1	91
	女	10.7	12.6	14.5		女	10.9	12.8	14.8

请运用综合评价法判断该女童是否为营养不良，如为营养不良，请根据营养不良评价表分析说明。

答：我国卫生部规定，在评价儿童的体格发育时，应从“年龄别身高”、“年龄别体重”和“身高（身高）别体重”三方面进行评价。尤其在判断是否为营养不良时，应采用综合评价法

单纯年龄别身高低于正常者叫发育迟缓；单纯身高别体重低于正常者叫做消瘦。如果年龄别身高和身高别体重均低于正常，则为严重慢性营养不良。

从上表可知该女童身高别体重低于中位数 14.1，年龄别身高低于中位数 93.9，为严重慢性营养不良。

自考备考三件宝：自考笔记、真题及答案、录音课件！

考试课件网：<http://www.examebook.cn/>

——我们专业提供自考易考题库课件集、自考免费电子书、自考历年真题及标准答案！

考试真题软件网：<http://down.examebook.com/>

——我们专业提供自考历年真题及答案整理版、自考考前模拟试题！

考试学习软件商城：<http://www.examebook.com/>

——为您提供各种考试学习软件课件更为便利的购买通道！