

2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究 试卷

(课程代码 03008)

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分。共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 对所研究的事物或现象的特征进行描述、界定或概括,以明确其含义及独特性的名词称为 【 C 】 3-49
A. 命题 B. 框架
C. 概念 D. 理论
2. 解释现象,陈述命题,反映哲理的一系列抽象的、相关的结构称为 【 B 】 3-49
A. 理论框架 B. 概念模式
C. 概念框架 D. 理论指导
3. 研究对象免于遭受伤害或不适的权利和不被剥削利用的权利是护理研究中基本伦理原则中的 【 A 】 1-11
A. 有益的原则 B. 公正的原则
C. 公平的原则 D. 尊重人的尊严的原则
4. 干扰变量也称为 【 C 】 2-26
A. 自变量。 B. 因变量
C. 外变量 D. 依变量
5. 在“体重与血压关系的研究”中,体重与血压值是 【 A 】 2-27
A. 研究指标 B. 评价指标
C. 推测指标 D. 主观指标、
6. 美国MEDLINE数据库中的英文字段Comments(cm)的中文含义是 【 D 】 4-64
A. 文摘标识 B. 合同号
C. 文献来源 D. 评论
7. 文献是指 【 A 】 2-19
A. 记录知识或信息的一切载体 B. 记录知识的工具
c. 传递知识的载体 D. 传递知识和信息的工具
8. 实验性研究和非实验性研究的分类依据是按 【 B 】 5-84
A. 研究对象不同 B. 研究设计内容不同
C. 研究目的不同 D. 研究性质不同
9. 下列属于非实验性研究特点的是 【 D 】 5-86
A. 设对照组 B. 随机分组
C. 随机抽样 D. 没有对研究对象施加干预
10. 采用临床现有的资料如病历进行数据分析和总结的研究方法称为 【 C 】 5-84
A. 质性研究 B. 前瞻性研究
C. 回顾性研究 D. 队列研究
11. 在研究中自变量是指 【 B 】 2-25
A. 受结果影响的因素 B. 导致研究结果产生的因素
C. 研究想要观察的结果 D. 干扰研究结果的因素
12. 综述论文的资料主要来自 【 B 】 9-178
A. 学术报告 B. 文献资料
C. 问卷调查 D. 选题过程
13. 每篇护理论文的关键词数一般为 【 B 】 2-36

- A. 2—3 个 B. 3—5 个
C. 4—6 个 D. 6—7 个
14. 一般认为问卷回收率不应低于 【 C 】 6-122
A. 40% B. 50%
C. 60% D. 80%
15. 在采用观察法收集资料的过程中, 研究者参与被观察者的活动, 但仍以观察为主。此观察者的角色类型是
【 D 】 6-128
A. 完全参与者 B. 观察性参与者
C. 局外观察者 D. 参与性观察者
16. KR-20 常用来反映研究工具信度的 【 D 】 7-134
A. 敏感性 B. 等同性
C. 稳定性 D. 内在一致性
17. 反映研究工具与其他测量标准之间相关关系的效度是 【 A 】 7-136
A. 效标关联效度 B. 内容效度
C. 表面效度 D. 结构效度
18. 下列有关概率 P 的描述正确的是 【 D 】 8-140
A. P 值范围在-1~1 之间
B. $P \leq 0.1$ 在统计学中被称为小概率事件
C. P 值越趋近于 1, 表示某事件发生的可能性越小
D. 在假设检验中, 当 $P \leq \alpha$ 时, 可得出差异有统计学意义的结论
19. 用于描述正态分布的计量资料型数据集中趋势的统计学指标是 【 A 】 8-142
A. 均数 B. 中位数
C. 标准差 D. 标准误
20. 研究人员同时采用两种痴呆评估量表对 100 名老人进行痴呆筛查, 要判断两种量表结果有无差异, 应采用的统计分析方法是 【 C 】 8-150
A. t 检验 B. 四格表 χ^2 检验
C. 配对 χ^2 检验 D. 行 \times 列表 χ^2 检验
- 二、多项选择题(本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分)**
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21. 文献检索常用方法包括 【 ABC 】 2-20
A. 顺查法 B. 倒查法
C. 抽查法 D. 追溯法
E. 循环法
22. 伦理审查委员会对研究项目审查的内容包括 【 AD 】 1-15
A. 研究的科学性 B. 研究的可行性
C. 研究的合理性 D. 研究的伦理原则
E. 研究的可重复性
23. 自变量的特征包括 【 BCD 】 2-25
A. 它是根据需要, 有待观察的因素
B. 它的变化会导致研究对象发生反应
C. 它的变化能够被研究者所操纵控制
D. 它的变化是受计划安排、系统性变化的
E. 它是能够以某种反应参数来表征的可测量因素
24. 护理研究论文的正文包括 【 BCDE 】 2-35
A. 摘要 B. 前言
C. 材料与方法 D. 结果
E. 讨论
25. 从文献的外表特征进行检索的途径包括 【 ABC 】 4-56

- A. 著者途径 B. 序号途径
C. 书名途径 D. 分类途径
E. 主题途径
26. 非概率抽样的主要方法有 【 ACDE 】 5-101
A. 方便抽样 B. 系统抽样
C. 定额抽样 D. 目的抽样
E. 滚雪球抽样
27. 进行预试验的目的是 【 BD 】 2-34
A. 加速科研工作的进展 B. 熟悉和摸清研究条件
C. 确认变量 D. 检查课题设计中的问题
E. 确立研究问题
28. 护理研究论文题目书写要求是 【 ABCD 】 9-163
A. 文章题目和内容要相符、切题
B. 新颖、能反映论文中最有特点的内容
C. 简明、文题不能太长、一般不超过 20 字为宜
D. 文题一般不用缩写词
E. 文字要有艺术性、富有吸引力
29. 关于非结构式观察法, 下列叙述正确的是 【 ACE 】 6-127
A. 观察者无明确的观察工具 B. 观察者应用量表进行记录
C. 观察者采用日记的方法进行记录 D. 观察者应用观察记录表格进行记录
E. 在观察中观察者可随时修改研究目的
30. 关于抽样误差, 下列叙述正确的是 【 CDE 】 8-140
A. 能够被控制和消除
B. 增加样本量不能减小抽样误差
C. 改进抽样方法使样本更具代表性可以减小抽样误差
D. 选择变异程度小的研究指标可以减小抽样误差
E. 要判断两样本数据之间的差异是否由抽样误差引起, 需要进行假设检验
31. 有关统计图绘制要求的描述正确的是 【 AE 】 8-159
A. 应根据资料类型和分析目的选用统计图
B. 图的长宽比例一般为 6: 8 或 8: 6
C. 图号和图题写在图的上方
D. 纵轴和横轴上无需标明刻度
E. 使用图例说明图中不同线条或色调所代表的不同事物
32. 关于折半信度, 下列叙述正确的是 【 ABD 】 7-134
A. 属于测量内在一致性的方法
B. 具体方法是将研究工具各项目分成两部分, 对两部分的分值进行相关分析
C. 两部分分值的相关系数即为折半信度
D. 包括前后折半法和奇偶折半法
E. 不同的折半方法所得到的结果相同
33. 对于信度和效度关系的描述正确的是 【 ACD 】 7-131
A. 研究工具的信度和效度是用来反映其质量高低的最常用指标
B. 研究工具可以只有信度而无效度
C. 信度和效度之间不是截然孤立的
D. 信度低的研究工具其效度肯定不高
E. 信度高的研究工具其效度也一定高

三、名词解释(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

34. 研究 1-2

研究工作具有探索性、创造性和连续性, 研究以系统的科学方法来探索 and 了解事物的现象为目的, 其结果可表现 3 个方面的内容: ①描述事物的现状。②发现事物的内在联系和本质规律。③引出定律或产生理论。

35. 知情同意 1-13

即研究对象有权利知道自己的健康状况和研究的相关情况, 包括研究的目的、步骤、期限和可能产生的问题和不便, 并可以对研究者或医护人员所采取的各种措施进行取舍。

36. 盲法 5-83

是指在不知道研究对象分组情况的前提下进行研究过程中指标的观测、数据的收集和结论的判断, 目的是减少可能的来自于研究者或受试者主观因素所导致的偏倚。

37. 个案研究 9-170

是针对个案护理的资料进行研究, 了解资料的内涵, 探讨未知领域或对新措施、新理论进行深入分析, 写出论文的过程。个案研究属于质性研究的一种。

38. 抽样误差 8-140

在抽样时, 由于总体中的各个体之间存在差异, 因此, 从样本所获得的指标与总体的实际指标不一定相等。由于抽样的偶然性而出现的样本指标与总体指标之间的差异, 称为抽样误差。

39. 计量资料 8-141

计量资料又称为定量资料。指用定量方法测定某项指标量的大小而获得的资料。这类资料一般有度量衡单位。

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. 简述选择研究问题的注意事项。 3-39

1. 选择对临床有指导意义的问题进行研究, 要立足于创新选题需要有明确的目的, 应明确规定须解决的问题和要达到的目的。
2. 选题范围不可太大, 涉及面过大则不易深入
3. 研究问题的可行性任何研究都会受到时间、经费、人力、技术等多方面条件的限制, 故应充分考虑研究工作完成的条件是否具备。
4. 最好结合自己熟悉的专业选题, 即自己能够掌控要进行的研究, 不论自己的知识水平、技术能力、研究经验等都能使自己有把握使研究得以顺利进行。

41. 简述文献检索的基本步骤。 2-19

文献检索步骤文献检索是一项实践性很强的活动, 它要求我们勤于思考, 并经常性的实践, 逐步掌握文献检索的规律, 从而迅速、准确地获得所需文献。一般来说, 文献检索可分为以下步骤: ①明确查找目的与要求。②选择检索工具。③确定检索途径和方法。④根据文献线索, 查阅原始文献。

42. 请列举访谈法的优缺点。 6-125

1. 访谈法的优点 由于访谈法需要研究者与研究对象面对面交谈, 增加了彼此的沟通, 其主要优点是:

(1) 应答率较高: 当研究者与研究对象面对面交谈时, 大多数研究对象均有反应, 能够提供相应的信息和资料。

(2) 适合于不能填写问卷的研究对象: 当研究对象有书写障碍时, 如文化程度低或受客观条件限制无法填写问卷, 研究者可以通过访谈法从研究对象处直接获取资料。

(3) 所获资料较为完整、丰富: 由于研究者组织参与访谈, 可以及时解答研究对象认为较为困惑的问题, 也可通过鼓励研究对象交谈, 获取更为丰富的资料。

2. 访谈法的缺点 虽然访谈法具有上述优点, 但同时也存在一些缺点:

(1) 费时: 由于访谈者多需要研究者一对一与研究对象进行交谈, 并且完成一次访谈所需的时间远远超过研究对象填写一份问卷的时间, 因此研究者往往需要花费大量的时间收集资料。

(2) 花费大: 研究者需要预约研究对象, 并前往预约地点见面、交谈, 电话费、交通费支出较大。此外, 若研究对象采用现场录音或录像的记录方式, 所需设备较为昂贵。

(3) 影响因素较多: 如研究对象可能因为需要面对面与研究对象交谈, 而有意改变自己的观点或行为, 造成结果偏差。

43. 简述假设检验的步骤。 8-141

假设检验的基本步骤如下:

(1) 建立假设: ① H_0 : 零假设, 即两总体均数相同。② H_1 : 备择假设, 即两总体均数不同。

(2) 确定检验水准: 用 α 表示, 通常取 0.05 或 0.01。

(3) 计算统计量: 根据研究目的和资料类型, 选择适当的公式计算统计量。

(4) 确定 P 值: 可通过查询相应的统计用表得到 P 的近似值, 如 χ^2 界值表 (附录 1)、 t 界值表 (附录 2)。

目前常用计算机软件进行统计学分析, 可在提供 χ^2 值、F 值或 Z 值的同时, 直接给出 P 值, 不需再查表。

(5) 做出统计推断: 如果 $P > \alpha$, 则认为 H_0 发生的可能性较大, 可得出“差异无统计学意义”的统计结论, 针对例 8-1, 可认为“城乡 6 岁男孩的平均身高差异无统计学意义”; 如果 $P < \alpha$, 则认为 H_0 发生的可能性很小, 属于小概率事件, 因此拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 可得出“差异有统计学意义”的统计结论, 即可认为“城乡 6 岁男孩的平均身高差异有统计学意义”。

五、应用题(本大题共 1 小题, 10 分)

44. 某护士抽取了 438 例患者, 旨在探讨静脉进针穿刺角度和患者的疼痛感的关系。请写出该研究的自变量、因变量和三个外变量。2-27

自变量: 进针的角度

因变量: 疼痛感

外变量: 穿刺部位、操作者的熟练程度、研究对象的疼痛耐受性。

qq593777558