

## 2011年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 护理学研究试题

课程代码: 03008

## 一、单项选择题(本大题共20小题, 每小题1分, 共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 护理论文的文题字数一般不超过( B )2-35

- A. 10个汉字  
B. 20个汉字  
C. 30个汉字  
D. 40个汉字

2. 在研究体重与血压的关系中, 自变量是( C )2-27

- A. 血压  
B. 性别  
C. 体重  
D. 年龄

3. 在“静脉进针穿刺角度的探讨”中, 研究者对进针角度与疼痛的关系进行了探讨, 该研究中的因变量是( D )2-27

- A. 进针角度  
B. 以往疼痛经历  
C. 穿刺部位  
D. 疼痛程度

4. 如研究者想要描述对某些人类经验或经历的理解, 则应选用的研究方法是( B )2-31

- A. 量性研究  
B. 质性研究  
C. 回顾性研究  
D. 前瞻性研究

5. 研究者对所研究问题提出的一个预期性的研究结果称为( D )2-28

- A. 变量  
B. 课题  
C. 检验  
D. 假设

6. 解释现象, 陈述命题, 反映哲理的一系列抽象的、相关的结构称为( A )3-49

- A. 概念模式  
B. 概念框架  
C. 理论框架  
D. 理论基础

7. 研究遵循的基本伦理原则中, 研究对象的自主权和充分认知的权利属于( D )1-11

- A. 有益的原则  
B. 公正的原则  
C. 保密的原则  
D. 尊重人的尊严的原则

8. 下列描述文献内容特征的选项是( B )2-19

- A. 标题  
B. 主题  
C. 著者  
D. 刊名

9. 分类途径的文献检索标识是( C )4-55

- A. 关键词  
B. 主题词  
C. 分类号  
D. 文献代码

10. 在研究中能够影响研究目的的主要变量是( A )2-25

- A. 自变量  
B. 依变量  
C. 外变量  
D. 控制变量

11. 关键词应选用( A )9-165

- A. 原形词  
B. 分类语言  
C. 代码语言  
D. 缩写词

12. 护理文献综述论文属于( B )9-178

- A. 议论文  
B. 专题性学术论文  
C. 科研工作书面总结  
D. 经验论文

13. 现象学研究属于( D )2-32

- A. 量性研究  
B. 实验性研究  
C. 类实验性研究  
D. 质性研究

14. 下列不属于访谈法的优点的是( D )6-125

- A. 应答率高
- B. 资料丰富、完整
- C. 适合文化程度较低而无法书写的研究对象
- D. 影响因素少

15. 在特殊的实验环境下观察调查对象对特定刺激的反应, 属于观察法中的( B )6-126

- A. 自然观察法
- B. 标准情形观察法
- C. 结构式观察法
- D. 非结构式观察法

16. 观察者作为参与者进入观察领域, 其活动以参与为主, 观察为辅。此时观察者的角色类型是 ( C )6-128

- A. 完全参与者
- B. 参与性观察者
- C. 观察性参与者
- D. 局外观察者

17. 评定者间信度常用来反映研究工具信度的( C )7-135

- A. 稳定性
- B. 内在一致性
- C. 等同性
- D. 可靠性

18. 表示二分制研究工具内在一致性的数值是( A )7-134

- A. KR-20 值
- B. 重测信度系数
- C. Cronbach'a 相关系数
- D. 等同性相关系数

19. 用于描述偏态分布的计量资料型数据集中趋势的统计学指标是( C )8-143

- A. 均数
- B. 几何均数
- C. 中位数
- D. 标准差

20. 比较某地区 150 例成年男性和 200 例成年女性甘油三酯平均值有无差异, 应选择的统计学方法是( A )8-144

- A. t 检验
- B.  $\chi^2$  检验
- C. u 检验
- D. 秩和检验

二、多项选择题(本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 研究结果可表现的内容包括( CDE )1-2

- A. 解决问题
- B. 发现问题
- C. 描述事物的现状
- D. 引出定律或产生理论
- E. 发现事物的内在联系和本质规律

22. 遵循伦理原则的基本方法包括( AC )1-12

- A. 评估益处与风险
- B. 尊重人的尊严
- C. 知情同意
- D. 免于伤害
- E. 保护隐私

23. 国际上著名的有关人体实验的伦理规范有( ABD )1-11

- A. 《纽伦堡法典》
- B. 《赫尔辛基宣言》
- C. 《南丁格尔誓言》
- D. 《贝尔蒙报告》
- E. 《日内瓦医学宣言》

24. 理想的理论框架或概念框架应该具备的主要特征包括( AB )2-22

- A. 逻辑性
- B. 指导性
- C. 理论性
- D. 规律性
- E. 完整性

25. 文献检索的方法包括( ABC )2-20

- A. 工具法
- B. 追溯法
- C. 循环法
- D. 五步法
- E. 快速法

26. 概率抽样方法包括( ABCD )5-99

- A. 系统抽样
- B. 单纯随机抽样

- C. 整群抽样  
D. 分层抽样  
E. 目的抽样
27. 类实验性研究的优点是( ABCD )5-91  
A. 在护理研究中可行性高  
B. 比较实用  
C. 不易触犯伦理原则  
D. 研究结果可说明一定问题  
E. 反映研究的科学性高
28. 论文摘要主要内容包括( ABCD )2-36  
A. 目的  
B. 方法  
C. 结果  
D. 结论  
E. 引文
29. 可选用测量法进行测量的内容有( AC )6-129  
A. 胆固醇水平  
B. 焦虑程度  
C. 红细胞数  
D. 护士的洗手行为  
E. 糖尿病患者的依从性
30. 关于信度的说法错误的是( BCDE )7-131  
A. 是反映研究工具质量高低的重要指标  
B. 用于评定研究工具是否能反映其所期望研究的概念  
C. 包括稳定性、内在一致性、敏感性三个特征  
D. 一般认为相关系数高于 0.6 时工具的信度才理想  
E. 对所有研究工具都应报告出它的所有三个特征的信度数值
31. 下列关于计数资料的叙述正确的是( AD )8-141  
A. 属于无序分类资料  
B. 计数资料具有半定量性质  
C. 要计算两个相关指标之比(相对比), 前提是两指标性质相同  
D. 若四格表中有格子理论数  $T < 1$ , 则要采用 Fisher 确切概率法进行分析  
E. 要确定两变量是否相关可采用线性相关分析法
32. 对于呈偏态分布的计量资料, 常采用的统计学方法包括( BE )8-142  
A. 均数、标准差  
B. 中位数、四分位数间距  
C. t 检验  
D. 方差分析  
E. 秩和检验
33. 可应用于计数资料的指标或统计学方法有( BDE )8-147  
A. t 检验  
B.  $\chi^2$  检验  
C. 标准差  
D. 构成比  
E. 秩和检验

### 三、名词解释(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

#### 34. 护理研究 1-2

护理研究是指通过科学的方法有系统地探究现存的或产生新的知识从而以直接或间接地指导护理实践的活动过程。

#### 35. 预试验 2-34

预试验也称可行性研究或试验研究, 是指在正式开始研究工作之前, 为保证科研工作能按照设计内容顺利进行, 先按照研究设计的内容进行小规模(选择少量研究对象)的试验, 目的是检查研究设计是否切合实际, 是否需要修正的地方, 核实样本量的估计是否合适, 也可摸清和熟悉研究条件, 使参加研究课题的研究人员可以统一方法, 减少误差, 并对完成课题的工作量、时间和人力安排做出恰当估计, 同时通过预试验还可获得研究工具如自行设计调查的有关信度与效度方面的资料。

#### 36. 干预 5-82

即研究者对研究对象人为施加的干预措施(也称处理因素)。干预措施是指施加于受试对象的, 试验中需要观察并阐明其处理效应的因素。

### 37.文献检索 2-19

文献检索是指将文献按照其外表特征(如标题、作者、来源、卷期页等)或内容特征(如文章的主题),根据一定的方式编排并存储在一定的载体上,并利用相应的方法、途径或手段,从检索系统中查出特定文献的过程。

### 38.假设检验 8-140

假设检验又称为显著性检验,是应用统计学原理,由样本之间的差异,去推断样本所代表的总体之间是否有差异的一种推断方法。

### 39.等级资料 8-141

等级资料又称为半定量资料或有序分类资料,介于计量资料和计数资料之间。指按照某种属性的不同程度分成等级,计数各组的例数而得到的资料。

## 四、简答题(本大题共4小题。每小题5分。共20分)

### 40.简述知情同意书应该包括的基本内容。1-14

知情同意书的基本内容应该包括:

- (1) 研究介绍,如研究项目名称、研究目的、可能持续的时间、研究程序以及有关研究的其他问题。
- (2) 风险描述,如参与研究可能给研究对象带来何种风险。
- (3) 利益描述,如参与研究可能给研究对象带来的利益。
- (4) 保密描述,如研究是匿名或保证对研究对象个人资料保密的承诺。
- (5) 补偿描述,如参与研究,研究对象可获得何种补偿。
- (6) 联系人说明,如研究者的联系方式。
- (7) 关于退出实验的说明,如研究对象有权自由选择退出研究的权利,且不受任何惩罚。研究对象拥有知情同意所有权和使用权。

### 41.简述质性研究常用的研究方法。5-95

质性研究主要包括:

- (1) 现象学研究法
- (2) 根基理论研究法
- (3) 人种学研究法

### 42.简述观察法的优缺点。6-128

观察法是护理研究者常用的一种通过观察研究对象而直接获取资料的方法。其优点表现在:

- (1) 适合于不易被测量的情形,如对行为和活动以及现象的研究。
- (2) 通过应用观察法研究者可获得更为深入的资料,尤其是质性研究多采用非结构式观察法获得深入、细致的研究资料。

观察法也存在一些缺点,主要表现在:

- (1) 伦理问题因观察法要求被观察者的行为直接在观察者的直视下进行,可能涉及的伦理问题较多且复杂,因此其可行性需要研究者慎重考虑。
- (2) 结果偏差被观察者可能因为知道被观察而有意改变其行为,从而造成结果的偏差。这一现象又称为霍桑效应。
- (3) 主观性由于观察结果受观察者的主观判断能力和分析能力的影响较大,所以所获资料的主观性较强,可能导致结果偏差,尤其是非结构式观察。
- (4) 耗时与其他资料收集的方法相比,一般而言观察法需要研究者花费大量的时间观察研究对象以收集相关资料。

### 43.简述减少抽样误差的方法。8-140

- (1) 尽可能采取随机抽样的方法,提高样本的代表性。
- (2) 增加样本量到适当水平。
- (3) 选择变异程度小的研究指标等。

## 五、应用题(本大题共1小题,10分)

44.某市卫生局对本市两所三甲医院护士技能操作考试合格情况进行了调查,并将结果做成了如下的统计表:

组别	总例数	合格	不合格
----	-----	----	-----

		例数	合格率	例数	不合格率
医院 A	48	42	87.5%	6	12.5%
医院 B	46	38	82.6%	8	17.4%
合计	94	80	85.1%	14	14.9%

表 1 两所医院护士技能操作考试合格情况

请问: (1)该统计表是否合理?如不合理, 写出不合理之处。

(2)该资料属于什么类型的资料?要比较两所医院护士技能操作考试合格率有无差异应选用何种统计方法?8-152

答:

(1) 该统计表不合理。不合理之处有: 表题位置不对, 有竖线和多余的横线, 百分数对应的数字不应重复出现%。

(2) 该资料必于计数资料, 应用  $X^2$  检验进行分析。

qq593777558