

2013 年 1 月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究 试题

课程代码: 03008

考生答题注意事项:

1. 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用 2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号, 使用 0.5 毫米黑色字迹笔作答。
4. 合理安排答题空间, 超出答题区域无效。

选择题部分

一、单项选择题 (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 研究着重 (B) 1-1

- | | |
|---------|---------|
| A. 个别现象 | B. 共性问题 |
| C. 创新问题 | D. 一般问题 |

2. 以下不属于文献分类的是 (D) 2-19

- | | |
|---------|---------|
| A. 一次文献 | B. 二次文献 |
| C. 三次文献 | D. 四次文献 |

3. 在静脉穿刺角度与进针疼痛的关系研究中, 因变量是 (B) 2-26

- | | |
|---------|-----------|
| A. 进针角度 | B. 疼痛感 |
| C. 穿刺部位 | D. 疼痛的耐受性 |

4. 按照预先设计的研究方案进行研究, 通过观察指标获得数据资料, 用科学方法来验证模式或理论, 用数字资料来描述结果的研究方法称为 (C) 2-31

- | | |
|---------|---------|
| A. 质性研究 | B. 田野研究 |
| C. 量性研究 | D. 历史研究 |

5. 研究者对所研究问题提出的一个预期性的研究结果或暂时性的答案称为 (B) 3-42

- | | |
|---------|---------|
| A. 研究变量 | B. 研究假设 |
| C. 研究结果 | D. 研究设计 |

6. 下列属于文献内容特征的是 (A) 4-53

- | | |
|---------|-------|
| A. 学科分类 | B. 刊名 |
| C. 姓名 | D. 题名 |

7. 载体是文献的 (A) 4-53

- | | |
|---------|---------|
| A. 外部形态 | B. 实质内容 |
| C. 外表特征 | D. 内容特征 |

8. 某护士欲调查发生糖尿病足的患者其既往的自我护理情况和随诊情况, 她准备通过翻阅患者的病例来获取这些信息。此护士的科研设计类型是 (B) 5-84

- | | |
|----------|-----------|
| A. 前瞻性研究 | B. 回顾性研究 |
| C. 实验性研究 | D. 类实验性研究 |

9. 某护士欲进行两种不同的宣教方法对于提高糖尿病患者注射胰岛素方法正确性的研究。他选取同年龄组 (年龄相差 5 岁以内), 同文化程度, 同病程组 (病程相差 1 个月以内) 的糖尿病患者一对一配对后分别进行不同方法的

宣教,并在宣教后对胰岛素注射的正确率进行观察。此种对照方法为 (C) 5-87

- A.组间对照 B.自身对照
C.配对对照 D.混合对照

10. 某研究者欲调查北京市医院护士的护理工作满意度,由于受研究时间和经费的限制,他拟从 50 所北京的医院中随机抽取 20 所医院,然后对这 20 所医院内的符合研究对象入选标准的护士进行问卷调查。此研究者使用的抽样方法是 (B) 5-101

- A.单纯随机抽样 B.整群抽样
C.分层抽样 D.系统抽样

11. 在研究过程中,当应答率低于下列哪一个比值时,研究者应作进一步的分析,查明原因 (D) 5-104

- A.90% B.85%
C.80% D.70%

12.根据访谈过程中是否有严格设计的访谈提纲,可以把访谈调查分为 (A) 6-124

- A.结构性访谈调查和非结构性访谈调查 B.个别访谈调查和集体访谈调查
C.电话访谈调查和网络访谈调查 D.一次性访谈调查和重复性访谈调查

13.资料收集中,对于研究人员的选择以下说法不正确的是 (A) 6-111

- A.无需考虑其以往的研究经历 B.应熟悉研究对象的特征
C.应具备良好的人际沟通能力 D.语言和语气不应带有任何评判性

14. 关于问卷的用词要求,以下说法正确的是 (C) 6-115

- A.设计问卷时可使用冗长的句子 B.可以一个问题中问两个问题
C.用词要适合被问者的文化程度 D.问题可有倾向性

15. 下列哪个变量的测量工具可以考虑用重测信度进行信度特征的测定 (D) 7-133

- A.知识 B.满意度
C.抑郁症状 D.生活质量

16. 可表示抽样误差大小的指标是 (B) 8-140

- A.标准差 B.标准误
C.均数 D.频数

17.下列属于等级资料的是 (C) 8-141

- A.身高、体重、年龄 B.血压、性别、学历
C.治愈、好转、无效 D.职业、职称、体温

18. 研究工具的信度值一般高于多少时才被认为较理想 (D) 7-135

- A.>0.5 B.>0.6
C.>0.65 D.>0.7

19. 若用统计图表示某医院护士学历构成情况,应选择 (D) 8-157

- A.线图 B.直线图
C.直方图 D.圆图

20. 关于护理研究论文的实用性,以下说法不正确的是 (D) 9-163

- A.体现在其实际指导意义和参考价值上
B.应当源于实践并能指导实践
C.应能解决护理实践过程中发生的问题
D.不是评价一篇论文是否有发表价值的一个方面

二、多项选择题 (本大题共 13 小题,每小题 2 分,共 26 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 《贝尔蒙报告》中强调的在以人为研究对象的研究中所遵循的基本伦理原则是 (ADE) 1-11

- A.有益 B.诚实
C.客观 D.公正
E. 尊重人的尊严

22. 文献检索的步骤包括 (ABCD) 2-19

- A.明确查找目的与要求
B.选择检索工具
C.确定检索途径和方法
D.根据文献线索, 查阅原始文献
E. 根据检索结果, 书写文献回顾
23. 下列属于数值变量的是 (ABE) 2-25
A.身高
B.体重
C.性别
D.血型
E. 白细胞计数
24. 下列属于特种文献的有 (ABCE) 4-54
A.专利文献
B.科技报告
C.学位论文
D.期刊
E. 会议论文
25. 按外在的物质形态划分文献可分为 (ABCE) 4-54
A.印刷型文献
B.缩微型文献
C.视听型文献
D.报道性文摘
E. 机读型电子出版物
26. 《中目》(医药卫生)的检索途径有 (BD) 4-59
A.著者途径
B.主题途径
C.关键词途径
D.分类途径
E. 书名途径
27. 下列有关质性研究特点的描述正确的是 (BCD) 2-31
A.质性研究也叫做定量研究
B.质性研究常用文字描述报告结果
C.质性研究中多用访谈法获取研究数据
D.质性研究中常用立意取样的方法获取研究对象
E. 质性研究仅包括两类, 即现象学研究和根基理论研究
28. 关于资料收集方法, 以下说法正确的是 (ABC) 5-95
A.用定量研究法进行资料收集时必须用数字将资料量化, 使之可测量可统计
B.定性研究资料以文字形式表示, 一般无需将资料用数字量化
C.大多数研究要求所收集的资料具有客观性
D.定性研究的资料收集过程中研究人员的主观判断不是必要的
E. 霍桑效应不会影响资料的有效性
29. 护理研究论文中, 关于作者署名, 以下说法正确的是 (ABC) 9-164
A.应包括作者的姓名、工作单位、地址和邮政编码
B.标明了科研成果的归属, 是作者对文章内容负责的一种表现
C.署名形式有集体署名和个人署名两种
D.科研论文作者的署名可用笔名
E. 署名多在文题之下, 多个作者姓名之间需要加标点符号
30. 关于访谈法收集资料的说法, 以下正确的是 (ADE) 6-124
A.结构式资料是按照提前设计的特定结构进行资料收集
B.非结构式资料收集是按事先设计的提纲进行
C.半结构式资料收集, 即是提出开放性问题, 在一个或几个主题下让研究对象自由阐述
D.结构式资料收集往往花费较多时间和精力设计研究工具
E. 非结构法收集的资料较深入, 但资料较难进行分析
31. 下列有关研究工具的内在一致性的描述正确的是 (AC) 7-133
A.表示研究工具各条目间的相关性
B.表示研究工具各条目的稳定程度
C.表示研究工具各条目间的同质性
D.表示研究工具的可操作性
E. 表示研究工具的可理解性
32. 下列有关研究工具信度和效度的描述正确的是 (BDE) 7-131
A.工具的信度高, 效度一定高
B.工具的信度低, 效度一定低

- C.工具的信度与效度都必须用数值表示 D.工具势必存在它的信度和效度
E. 工具信度和效度是程度上“高”或“低”的问题
33. 质性研究的常用方法有 (ACE) 5-95
A. 根基理论研究 B.相关性研究
C. 现象学研究 D.队列研究
E. 人种学研究

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

34. 护理研究 1-2

护理研究是指通过科学的方法有系统地探究现存的或产生新的知识从而以直接或间接地指导护理实践的活动过程。

35. 统计描述 2-35

统计描述是指运用各种统计学手段 (如统计表、统计图、统计指标等) 对观测数据的数量特征进行客观如实地描述和表达

36. 文献检索 2-19

文献检索是指将文献按照其外表特征 (如标题、作者、来源、卷期页等) 或内容特征 (如文章的主题), 根据一定的方式编排并存储在一定的载体上, 并利用相应的方法、途径或手段, 从检索系统中查出特定文献的过程。

37. 盲法 5-83

是指在不知道研究对象分组情况的前提下进行研究过程中指标的观测、数据的收集和结论的判断, 目的是减少可能的来自于研究者或受试者主观因素所导致的偏倚。盲法可分为单盲法和双盲法。

38. 量表 6-111

是由一组封闭式问题组成的以评分的方式衡量人们态度和行为的收集资料的工具, 在问卷调查法中广泛应用。

39. 假设检验 8-140

假设检验又称为显著性检验, 是应用统计学原理, 由样本之间的差异, 去推断样本所代表的总体之间是否有差异的一种推断方法。

四、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. 简述 IRB 对研究项目的审查内容。 1-15

答:

为了获得 IRB 的认可, 研究者必须确保: ①带给受试对象的风险为最小。②与预期的益处相比, 带给受试对象的风险合理。③公平选择受试对象。④得到受试对象或其法定监护人的知情同意, 知情同意书书写适当。⑤研究计划对资料收集过程予以监督, 以确保受试对象的安全。⑥充分保护受试对象的隐私权, 确保研究资料的保密性等。

41. 简述护理研究的范畴。 1-3

答:

护理研究可分为基础性和应用性研究, 目前大部分护理研究内容着重应用性研究。一般只要在护理职责范围内的同人的生物属性和社会属性有关的健康问题以及护理专业自身发展有关的问题, 都属于护理研究的范畴。

42. 抽样的目的和抽样原则是什么? 5-98

答:

抽样的目的是用样本信息推断总体特征。因此, 抽样原则是必须保证样本的来源可靠并对总体具有代表性。

(1)保证样本来源的可靠性: 是指样本中每一个观察单位都必须来自于同质的总体, 即严格遵循研究对象的纳入标准和排除标准。

(2)选取有代表性的样本: 代表性指样本能充分反映总体的本质。可以从两个方面来保证样本对于总体的代表性: ①抽样遵循随机化原则。②保证足够的样本量。

43. 请写出 5 条预试验的目的。 6-111

答:

预试验的目的是测试资料收集的时间、研究工具的应用情况、研究对象的反应、研究工具的文字是否通顺易懂、是否要培训调查员等。同时预试验还可获取研究工具的某些基本特征 (例如某些信度和效度指标)。

五、应用题 (本大题 10 分)

44. 某研究小组将一个社区内的高血压患者 140 名随机分为两组, 即干预组 (定期用药指导) 和对照组 (常规护理) 各 70 例。半年后调查两组患者高血压用药的依从性 (见下表), 并比较两组结果, 了解干预措施对提高高血压患者的用药依从性是否效。8-144

表三

组别	总例数	依从性 (例数)		
		完全依从	部分依从	不依从
干预组	70	41	25	4
对照组	70	20	29	21

- 问: (1) 本课题取得的研究资料属于哪种类型资料?
(2) 若比较两组间有无差异应采用哪种推断性统计方法?
(3) 请指出本题中表格有哪些错误?

答:

- (1) 等级资料
- (2) 秩和检验
- (3) 表格中错误:

表号应用阿拉伯数字表示

无表题

表内不应有竖线

表格应只有三线, 即顶线、底线和分界线, 该表有一条多余的横线。